



Sommario

<i>INFORMAZIONI SULLE DISPOSIZIONI REGIONALI</i>	<i>2</i>
<i>COME REGISTRARE LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID-19</i>	<i>4</i>
<i>INVIO TERZA DOSE DELLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2.....</i>	<i>8</i>
<i>COME STAMPARE IL MODULO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2.....</i>	<i>11</i>



INFORMAZIONI SULLE DISPOSIZIONI REGIONALI

IMPORTANTE!

Per la registrazione della **TERZA DOSE** della **vaccinazione ANTI SARS-CoV-2**, le indicazioni di Regione Lazio, prevedono che il MMG indichi una delle due tipologie per le quali è prevista:

- **dose addizionale** di vaccino COVID-19: dopo almeno 28 giorni dall'ultima somministrazione, a completamento del ciclo vaccinale nei soggetti adulti e adolescenti di età >12 anni (vaccino Comirnaty) o >18 anni (vaccino Spikevax) in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante. Rientrano nella suddetta categoria i trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello di immunocompromissione assimilabile.
- **dose booster**, al fine di mantenere una efficace risposta immune al vaccino dopo il completamento del ciclo vaccinale, dopo almeno 6 mesi dall'ultima somministrazione, nei grandi anziani (>80 anni) e nei soggetti ricoverati nelle RSA. Tale opzione può essere resa disponibile anche agli operatori sanitari, a seconda del livello di esposizione all'infezione, del rischio individuale di sviluppare forme gravi di COVID-19 e in accordo alla strategia generale della campagna vaccinale.

Millewin proporrà all'utente di scegliere la tipologia. Questo dato è OBBLIGATORIO per una corretta registrazione e invio al sistema regionale.



Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

Le specifiche regionali, in merito alla registrazione ed invio della somministrazione della **TERZA DOSE della vaccinazione ANTI SARS-CoV-2**, prevedono, inoltre, l'obbligatorietà della compilazione dei seguenti campi:

- ✓ *Comune di erogazione*, cioè comune di esecuzione del vaccino
- ✓ *Stato di gravidanza*, che è visibile solo per i pazienti di sesso femminile di età < 55 anni
- ✓ *Indicazione su infezione SARS-CoV-2*



Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

COME REGISTRARE LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI COVID-19

- Accedere al folder *Vaccini* della cartella clinica del paziente
- Doppio clic sul campo *Vaccino* per accedere alla *Tabella vaccini*
- Ricercare **COVID-19 3**
- Cliccare sulla voce **COVID-19 3**, per visualizzare la scheda per la registrazione delle informazioni aggiuntive sul vaccino

Terapie	Richieste	Vaccini	consigli	mBds
Scadenza	Vaccino		Rich Data	00.00.0000
Tabella vaccini				
COVID-19 1				
COVID-19 2				
COVID-19 3				

- Compilare i seguenti campi obbligatori per l'invio della somministrazione del vaccino:
 - ✓ *data di somministrazione*
 - ✓ *vaccino fornito da ASL*
 - ✓ *campagna vaccinale (opzione facente parte di una campagna vaccinale)*
 - ✓ *comune di erogazione*
 - ✓ *categoria di rischio*
 - ✓ *stato di gravidanza (solo per le pazienti di età < 55 anni)*
(tramite pulsante *Dati aggiuntivi per COVID*)
 - ✓ *Indicazione su infezione pregressa SARS-CoV-2* (tramite pulsante *Dati aggiuntivi per COVID*)
 - ✓ *sito inoculo*
 - ✓ *nome del vaccino utilizzato, ricercandolo nel prontuario farmaceutico*
 - ✓ *numero lotto*
 - ✓ *scadenza*



Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

Vaccino. Informazioni aggiuntive

COVID-19 3

Vaccinazione

Data: 02/10/2021 Vaccino fornito da ASL
 facente parte di una campagna vaccinale
 facente parte del percorso vaccinale del paziente

Eseguito in office
 Eseguito a domicilio
 Eseguito in RSA
 Altro esecutore
 NON eseguito

Comune di erogazione: ROMA

Dose: 3

Inserisci categoria di rischio
Dati aggiuntivi per COVID...
Reazione awersa ...
Sito inoculo

Note: Medico responsabile vaccinazione: FI

Vaccino utilizzato

Aggiungi vaccino

Lotto N° Scadenza Lotto: 00/00/0000

IMPORTANTE!

1. Per i pazienti di sesso femminile di età < 55 anni, scegliere uno dei tre stati di gravidanza evidenziati di seguito

Stato sconosciuto

Non in gravidanza

In gravidanza

Non esclude la gravidanza

Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

In caso di mancata registrazione, verrà restituito il seguente messaggio:



2. Scegliere uno degli stati seguenti:

Dati aggiuntivi per vaccinazione COVID	
Infezione SARS-CoV2: Stato sconosciuto	Stato sconosciuto Nessuna Pregressa Infezione Sars-CoV2 Pregressa Infezione SarsCoV2 Dato non Disponibile

3. Cliccare su *Sito inoculo* per indicare sito di somministrazione ed invio di sommistrizione
4. Cliccare su *Aggiungi vaccino*, perché è indispensabile inserire il siero utilizzato.

Vaccino utilizzato
Aggiungi vaccino
Lotto N° <input type="text"/>
Scadenza Lotto: <input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▼"/>
<input type="button" value="Ricopia vaccino e lotto"/>



Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

Digitare **COVID** per visualizzare i vaccini disponibili nel prontuario farmaceutico

Scelta farmaco

Farmaci	Principi Attivi - ATC	COVID	Galenici
CICOVID-19 VACCINE ASTRA*10FL4ML		,00 NX	
CICOVID-19 VACCINE ASTRA*10FL5ML		,00 NX	
CICOVID-19 VACCINE MODERNA*10FL		,00 NX	

Stesso P.A. e confezionamento

CICOVID-19 VACCINE MODERNA*10FL	,00 NX
CICOMIRNATY*195FL 0,45ML	,00 NX

5. Inserire lotto e scadenza del siero




Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

INVIO TERZA DOSE DELLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

IMPORTANTE!

L'invio delle vaccinazioni avviene contestualmente all'inserimento in cartella.

- Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, l'utente/medico potrà confermare la registrazione cliccando sul pulsante *Salva*
- Verrà richiesto di scegliere una delle due tipologie di dose, perché per disposizioni regionali, è un'indicazione OBBLIGATORIA.



Si ricorda che:

- a) **dose addizionale** di vaccino COVID-19: dopo almeno 28 giorni dall'ultima somministrazione, a completamento del ciclo vaccinale nei soggetti adulti e adolescenti di età >12 anni (vaccino Comirnaty) o >18 anni (vaccino Spikevax) in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante. Rientrano nella suddetta categoria i trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello di immunocompromissione assimilabile.




Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

b) **dose booster**, al fine di mantenere una efficace risposta immune al vaccino dopo il completamento del ciclo vaccinale, dopo almeno 6 mesi dall'ultima somministrazione, nei grandi anziani (>80 anni) e nei soggetti ricoverati nelle RSA. Tale opzione può essere resa disponibile anche agli operatori sanitari, a seconda del livello di esposizione all'infezione, del rischio individuale di sviluppare forme gravi di COVID-19e in accordo alla strategia generale della campagna vaccinale.

▪ Scelta la tipologia di dose:

- ✓ la vaccinazione sarà automaticamente inviata al server regionale
- ✓ comparirà automaticamente il seguente messaggio



- ✓ Il modulo di **attestazione di avvenuta vaccinazione Anti-SARS-CoV-2/COVID-19** verrà salvato automaticamente nel folder *Certificati* della cartella del paziente

Accertamenti	Pressione	Certificati	Esenz.	Intolleranze
		Certificati	gg	Inizio scadenza
02.10.21	✓			
02.10.21	✓	Vaccinazione COVID		R



Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

- ✓ La registrazione della vaccinazione verrà evidenziata nel folder Vaccini della cartella del paziente con la colorazione **verde**.


Terapie	Richieste	Vaccini	consigli	mBds	Scadenze
Scadenza	Vaccino	*	Rich.Data	Note	
			00.00.0000		
	COVID-19	1	01.03.2021 cat		

Si ricorda che la colorazione **verde** indica corretta registrazione sul server regionale della somministrazione del vaccino.
Invece la colorazione **rossa** indica che il vaccino non è stato correttamente inviato a FSE Lazio

Terapie	Richieste	Vaccini	consigli	mBds	Scadenze
Scadenza	Vaccino	*	Rich.Data	Note	
			00.00.0000		
	INFLUENZA		00.00.0000		
	COVID-19	1	26.02.2021 cat		

IMPORTANTE!

Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'invio della registrazione del vaccino fallisce, Millewin mostrerà il seguente messaggio a video





Inserimento - Invio TERZA DOSE delle vaccinazioni ANTI COVID-19

informando l'utente che è possibile visualizzare l'elenco dei pazienti il cui invio della registrazione del vaccino è fallito da *Ricerca paziente* scegliendo di visualizzare i pazienti *Personalni* ed infine cliccando su *Avvisi*

Pazienti di

Tutti Personalni

Cerca in

Tutto l'archivio Agenda

Scadenze Registro

Avvisi

Vaccinazione non inviata (AN)

Vaccinazione non inviata (ANTI)

COME STAMPARE IL MODULO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

- Accedere al folder *Certificati* della cartella del paziente
- Cliccare sull'icona mostrata di seguito per visualizzare il PDF del modulo di attestazione di avvenuta vaccinazione

